

## 2021-2022数学分析B2期中解答

一、(每小题8分, 共24分)

1.求函数 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 的4阶Taylor展开式.

**解:** 利用一元函数的Taylor公式

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!}t^2 + o(t^2)$$

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) - \frac{1}{8}(x^2 + y^2)^2 + R_4$$


2.设函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 曲面 $2z = x^2 + y^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处的单位外法向量为 $\vec{n}$ , 求 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_M$ .

**解:** 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z$ ,  $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, -2)$ ,  $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_M = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)|_M \cdot \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1) = \frac{1}{3}.$$

3.在边长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,  $N$ 是 $CC_1$ 的中点,  $O$ 是正方形 $ABCD$ 的中心,  $M$ 是 $A_1D_1$ 的中点, 求点 $M$ 到平面 $OB_1N$ 的距离.

**解:** 如图建立坐标系, 则下列点的坐标:



$$B_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1), O(0, 0, 0), N(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), M(0, -\frac{1}{2}, 1)$$

过 $O, B_1, N$ 三点的平面方程是

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}y + \frac{2}{4}z = 0$$

$$\text{即 } x + 3y - 2z = 0. \text{ 点 } M \text{ 到平面的距离 } d = \frac{|3(-\frac{1}{2}) - 2|}{\sqrt{1+9+4}} = \frac{\sqrt{14}}{4}.$$

二、(10分)设 $y = \varphi(x)$ 是方程 $\sin y + e^x - xy - 1 = 0$ 在 $(0, 0)$ 点某邻域内确定的隐函数, 求 $\varphi'(0)$ ,  $\varphi''(0)$ .

**解:** 方程两边对 $x$ 求导得  $\cos yy'(x) + e^x - y - xy'(x) = 0$ ,

$$\text{所以 } y'(x) = \frac{y - e^x}{\cos y - x}. \quad \dots \dots \text{ (3分)}$$

$$\varphi'(0) = -1 \quad \dots \dots \text{ (5分)}$$

$$y''(x) = \frac{(y'(x) - e^x)(\cos y - x) - (y - e^x)(-\sin y y'(x) - 1)}{(\cos y - x)^2} \quad \dots \dots \text{ (8分)}$$

$$\text{所以 } \varphi''(0) = -3 \quad \dots \dots \text{ (10分)}$$

三、(12分) 求函数  $f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$  在闭区域  
 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$  上的最大值与最小值.

**解:** 先求驻点,

$$\begin{cases} f'_x = 2xy(4 - x - y) - x^2y = xy(8 - 3x - 2y) = 0 \\ f'_y = x^2(4 - x - y) - x^2y = x^2(4 - x - 2y) = 0 \end{cases}$$

解得驻点  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$  ..... (6分)

在边界点有  $f(0, y) = 0, f(x, 0) = 0$ ,

在直线  $x + y = 6$  上  $z = f(x, 6 - x) = -12x^2 + 2x^3$ , 考虑在边界上的最值,

$$\frac{df}{dx} = -24x + 6x^2 = 0$$

解得  $x = 0, x = 4, f(0, 6) = f(6, 0) = 0, f(4, 2) = -64$

所以在边界  $x + y = 6$  上, 最大值是 0, 最小值是 -64

综上所述, 在区域  $D$  上, 最大值是 4, 最小值是 -64. ..... (12分)

四、(12分) 给定正整数  $n$ , 设函数  $f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^n \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

讨论  $n$  为何值时,  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处:(1)连续; (2)可微.

**解:** (2) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$|(x + y)^n \ln(x^2 + y^2)| = |2r^n(\cos \theta + \sin \theta)^n \ln r| < 2^{n+1}r^n |\ln r|$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} 2^n r^n \ln r = 0 = f(0, 0)$  对任意正整数  $n$  成立, 所以 对任意正整数  $n$ ,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  连续。 ..... (4分)

$$(2) \left| \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = |2r^{n-1}(\cos \theta + \sin \theta)^n \ln r| \leq 2^{n+1}r^{n-1} |\ln r|$$

所以  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = 0$  对  $n > 1$  成立,

$n \geq 2$  时  $f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$ ,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  可微. ..... (9分)

$n = 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x^2 = -\infty$ , 偏导数不存在, 所以不可微..... (12分)

五、(每小题8分, 共24分)

1. 计算  $\iint_D y^2 dx dy$ , 其中  $D$  是由摆线  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$ ) 及  $y = 0$  围成

的闭区域.

**解:** 设参数方程确定了函数 $y = y(x)$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi a$

$$\begin{aligned} \iint_D y^2 dx dy &= \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy \quad \dots(4 \text{ 分}) \\ &= \int_0^{2\pi a} y^3(x) \frac{1}{3} y dx \xrightarrow{x=a(t-\sin t)} \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} a^3 (1 - \cos t)^3 da (t - \sin t) \\ &= \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^4 dt = \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (2 \sin^2 \frac{t}{2})^4 dt \quad \dots(6 \text{ 分}) \\ &= \frac{64a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 u du = \frac{35}{12} \pi a^4 \quad \dots(8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

2. 计算  $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$ ,  $\Sigma$  为锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  位于平面  $z = 0, z = 1$  之间的部分.

**解:** 根据对称性, 只需计算第一卦限部分曲面上的积分再乘以4. 设  $\Sigma_1 : z = \sqrt{x^2 + y^2}, D : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$  作极坐标代换,  $D$  转化为  $D' : \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], r \in [0, 1]$  .....(2分)  
 $z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, dS = \sqrt{1 + z'_x^2 + z'_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$  .....(4分)

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |xyz| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS = 4\sqrt{2} \iint_D xy \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta r dr = \frac{2\sqrt{2}}{5} \quad \dots(8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

3. 计算  $\iiint_V |z| dx dy dz$ , 其中  $V$  是曲面  $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$  所围成的闭区域 ( $a > 0$ ).

**解:** 积分区域关于三个坐标面对称, 被积函数关于  $x, y, z$  都是偶函数, 只需计算第一卦限部分的积分, 令  $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$

边界曲面化为  $r^4 = a^2(r^2 \sin^2 \theta - r^2 \cos^2 \theta) = -a^2 r^2 \cos 2\theta$ , 即  $r^2 = -a^2 \cos 2\theta$ ,

第一卦限部分  $V' : \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}], \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}], r \in [0, a\sqrt{-\cos 2\theta}]$ . .....(3分)

$$\begin{aligned} \iiint_V |z| dx dy dz &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a\sqrt{-\cos 2\theta}} r \cos \theta r^2 \sin \theta dr \quad \dots(5 \text{ 分}) \\ &= 8 \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} a^4 (-\cos 2\theta)^2 \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\pi}{12} a^4. \quad \dots(8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

六、(10分)已知曲线  $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 6x + 2y - 4 = 0$  是椭圆, 利用拉格朗日乘数法求该椭圆的面积.

**解:** 设椭圆中心点坐标为  $(m, n)$ , 令  $u = x - m, v = y - n$ , 则  $(u, v)$  满足的方程应不含一次项,

$$\begin{aligned} &5(u+m)^2 - 6(u+m)(v+n) + 5(v+n)^2 - 6(u+m) + 2(v+n) - 4 \\ &= 5u^2 - 6uv + 5v^2 + (10m - 6n - 6)u + (10n - 6m + 2)v + (5m^2 - 6mn + 5n^2 - 6m + 2n - 4) = 0 \end{aligned}$$

所以  $\begin{cases} 10m - 6n - 6 = 0 \\ 10n - 6m + 2 = 0 \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} m = \frac{3}{4} \\ n = \frac{1}{4} \end{cases}$   
 $5m^2 - 6mn + 5n^2 - 6m + 2n - 4 = -6$ . ....(3分)

考虑椭圆上的点到中心的最大最小值.

$$F(u, v, \lambda) = u^2 + v^2 + \lambda(5u^2 - 6uv + 5v^2 - 6)$$

条件驻点满足

$$\begin{cases} F'_u = 2(u + 5\lambda u - 3\lambda v) = 0 & (1) \\ F'_v = 2(v - 3\lambda u + 5\lambda v) = 0 & (2) \\ F'_{\lambda} = 5u^2 - 6uv + 5v^2 - 6 = 0 & (3) \end{cases}$$

已知最大，最小值点不在坐标轴上， $u \neq 0, v \neq 0$ , 由(1)(2)两式得

$$\frac{u}{v} = \frac{3\lambda}{1+5\lambda} = \frac{1+5\lambda}{3\lambda}$$

整理得  $16\lambda^2 + 10\lambda + 1 = 0$ , 所以  $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{8}$

$\lambda = -\frac{1}{2}$  代回 (1) 式, 得  $u = v$ , 代入 (3) 式得  $5u^2 - 6u^2 + 5u^2 - 6 = 0, u^2 = \frac{3}{2}$

$\lambda = -\frac{1}{8}$  代回 (1) 式, 得  $u = -v$ , 代入 (3) 式得  $5u^2 + 6u^2 + 5u^2 - 6 = 0, u^2 = \frac{3}{8}$  ....(7分)

从而可得椭圆 长短半轴分别为  $\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 椭圆面积是  $S = \pi\sqrt{3}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}\pi$ . ....(10分)

七、(8分)证明：积分方程

$$f(x, y) = 1 + \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv$$

在  $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  上至多有一个连续解.

证：(反证法) 假设  $f(x, y), f_1(x, y)$  是积分方程两个不同的连续解.

$$\text{令 } g(x, y) = f(x, y) - f_1(x, y) \quad g(x, y) = \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv - \int_0^x du \int_0^y f_1(u, v) dv = \int_0^x du \int_0^y g(u, v) dv$$

.....(3分)

由于  $g(x, y)$  在  $[0, 1] \times [0, 1]$  连续, 故有界, 设  $|g(x, y)| < M$ , 由积分方程可得.

$$|g(x, y)| \leq \int_0^x du \int_0^y M dv = Mxy$$

由此结论, 利用积分不等式又可得

$$|g(x, y)| \leq \int_0^x du \int_0^y |g(u, v)| dv \leq M \int_0^x du \int_0^y uv dv = M \frac{x^2}{2} \frac{y^2}{2}.$$

归纳可得到

$$|g(x, y)| \leq \frac{Mx^n y^n}{(n!)^2} \leq \frac{M}{(n!)^2} \quad \dots\dots(6分)$$

对任意自然数  $n$  成立, 令  $n \rightarrow \infty$ , 可得  $g(x, y) = 0$ .

所以积分方程只有一个连续解.

.....(8分)